

伏見CKD連携パス

3ヶ月フォロー

バリエーション (発生したら定期受診の前でも受診させて下さい)

- 1. 血清Creが前回の1.3倍以上 (stage1-3)
- 2. 尿蛋白の急激な増加
- 3. 血清K 5.5 mEq/L以上
- 4. Hb 11 g/dL以下
- 5. コントロール不能の高血圧
- 6. 肺水腫
- 7. 浮腫の急激な悪化

患者氏名 性別

生年月日 (西暦) 年 月 日 歳 ◎ かかりつけ医受診時も必須 (検査は病状に応じて)

○ 専門医受診時は必須

施設	かかりつけ医														
経過	専門医		○				○				○				○
実施日	西暦 年														
診察・測定	診察室血圧 (mmHg)	◎									◎				
	家庭血圧 (mmHg)	◎									◎				
	身長 () / 体重 (kg)	◎									◎				
検査	尿蛋白定性	○									○				
	尿蛋白定量 (部分尿) (mg/dL)	○									○				
	尿Cre定量 (部分尿) (mg/dL)	○									○				
	尿蛋白/尿Cre	○									○				
	尿潜血定性	○									○				
	BUN (mg/dL)	○									○				
	血清Cre (mg/dL)	○									○				
	推算GFR (ml/min)	○									○				
	K (mEq/L)	○									○				
	Hb (g/dL)	○									○				
	Glu (mg/dL)	○									○				
	HbA1c (%) (糖尿病の場合)	○									○				
	T-Chol (mg/dL)	○									○				
	TG (mg/dL)	○									○				
	LDL-C (mg/dL)	○									○				
HDL-C (mg/dL)	○									○					
胸部レントゲン	○														
心電図	○														
評価	CKDステージ														
	合併症	□ 有 () □ 無													
指導・説明	食事指導	カロリー kcal 塩分 g 蛋白質 g □カリウム制限	カロリー kcal 塩分 g 蛋白質 g □カリウム制限	カロリー kcal 塩分 g 蛋白質 g □カリウム制限	カロリー kcal 塩分 g 蛋白質 g □カリウム制限										
	生活指導	□禁煙 □減酒 □減量	□禁煙 □減酒 □減量	□禁煙 □減酒 □減量	□禁煙 □減酒 □減量										
薬剤	薬剤変更の必要性	□有 ↓ □無	□有 ↓ □無	□有 ↓ □無	□有 ↓ □無										
かかりつけ医への報告		目標血圧 診察室 / mmHg未満 家庭 / mmHg未満													
CKDステージ GFR (ml/min/1.73 m ²)															
1 90以上															
2 60-89															
3 30-59															
4 15-29															
5 15未満															

再診時には最近の検査データ・処方内容の添付をお願いします。